

# 众安无限爱·癌症特药保险特定药品清单

列表1. 特定进口药品及适用疾病清单

药品的使用需符合中国国家药品监督管理局或出口国家或地区的药品监督管理部门批准的该药品说明书中所列明的适应症和用法用量，列表1中所有药品用药医院为博鳌超级医院

序号	商品名	分子名/药品名	厂家	适应症限制
1	Rydapt	Midostaurin/米喹妥林	诺华肿瘤	1、FLT3突变阳性的急性髓性白血病（AML）成人患者2、侵袭性系统性肥大细胞增多症（ASM）、伴有血液肿瘤的 systemic 肥大细胞增多症（SM-AHN）或肥大细胞白血病（MCL）
2	Sarclisa	Isatuximab/ Isatuximab 艾沙妥昔单抗	赛诺菲	1、联合卡非佐米和地塞米松治疗接受过至少一种既往治疗的多发性骨髓瘤成年患者 2、联合泊马度胺和地塞米松治疗至少接受过两种既往治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶抑制剂）的多发性骨髓瘤成年患者
3	Tabrecta	Capmatinib/卡普替尼	诺华肿瘤	MET14号外显子跳跃突变非小细胞肺癌
4	Pepaxto	melphalanflufenamide 美法仑氟苯甲酰胺	维健医药	PEPAXTO®(美法仑氟苯甲酰胺)与地塞米松联用,用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤患者
5	Retevmo	selpercatinib/塞卡替尼	礼来	1、治疗转染重排基因（RET）融合阳性的转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的成年患者 2、需要系统性治疗的携带RET突变的晚期或转移性甲状腺髓样癌成人和12岁及以上的儿童患者 3、需要系统性治疗和放射性碘治疗（如适用）难治的RET融合阳性的晚期或转移性甲状腺癌成人和12岁及以上的儿童患者
6	Cotellic	Cobimetinib/考比替尼	罗氏制药	用于BRAFV600E或V600K突变阳性、不可切除性或转移性黑色素瘤患者的治疗
7	BRAFTOVI	Encorafenib/恩拉非尼	皮尔法伯	1、与西妥昔单抗联用，用于治疗接受BRAFV600E突变的成年转移性结直肠癌（CRC）成年患者，这些患者已接受过全身性治疗 2、与Binimetinib联合用于治疗BRAFV600E或V600K突变的不可切除或转移性黑色素瘤患者
8	LONSURF	曲氟尿苷替匹嘧啶	大鹏	LONSURF适用于治疗既往至少接受过2线化疗治疗的转移性胃或食管胃连接部腺癌成人患者，其中化疗包括氟嘧啶、铂类药物、紫杉烷或伊立替康以及适当时，HER2/neu靶向治疗
9	Adcetris	BrentuximabVedotinforInjection/注射用维布妥昔单抗	武田	适用于治疗以下CD30阳性淋巴瘤成人患者：与化疗联合治疗既往未经治疗的系统性间变性大细胞淋巴瘤（sALCL）或其他表达CD30的外周T细胞淋巴瘤（PTCL），包括血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤（AITL）和非特指型PTCT（PTCL-NOS）
10	Zynlonta	loncastuximabtesirine-lpyl/朗妥昔单抗	AdcTherapeuticsAmerica, Inc.	治疗接受过两线或两线以上系统性治疗的成人复发或难治性的大B细胞淋巴瘤患者，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）非特指型、由低级别淋巴瘤转化的DLBCL以及高级别B细胞淋巴瘤患者
11	Istodax	romidepsin/罗米地霉素	CelgeneCorporation	ISTODAX是一种组蛋白去乙酰化酶（HDAC）抑制剂，适用于既往已接受至少1种系统治疗的皮肤或外周T细胞淋巴瘤（CTCL）患者的治疗
12	Polivy	polatuzumabvedotin-piiq/泊洛妥珠单抗	罗氏制药	复发/难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者

13	UKONIQ	umbralisib/厄布利塞	TGTherapeutics, Inc.	UKONIQ是一种激酶抑制剂，用于治疗成人患者： 1、复发或难治性边缘区淋巴瘤（MZL），至少接受过一次以抗CD20为基础的方案 2、复发或难治性滤泡性淋巴瘤（FL），至少接受过三次系统治疗
14	Kisqali	Ribociclib/瑞博西尼	诺华肿瘤	HR+HER2-绝经后晚期乳腺癌
15	Piqray	Alpelisib/阿培利司	诺华肿瘤	HR+HER2-绝经后PIK3CA突变晚期乳腺癌
16	Talzenna	Talazoparib/他拉唑帕尼	辉瑞	治疗BRCA突变、HER2阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者
17	维全特	培唑帕尼	诺华肿瘤	特定子类型的晚期软组织肉瘤
18	Fotivda	tivozanib/替沃扎尼	AveoPharmaceuticals, Inc.	FOTIVDA是一种激酶抑制剂，用于治疗复发或难治性晚期肾细胞癌（RCC）的成人患者
19	Jemperli	dostarlimab/多塔利单抗	葛兰素史克	复发或晚期子宫内膜癌
20	Cometriq	Cabozantinib/卡博替尼	江苏豪森	COMETRIQ是激抑制剂适用于为进展性，转移甲状腺髓样癌（MTC）患者的治疗
21	Kymriah	tisagenlecleucel/司利弗明	诺华肿瘤	1、治疗复发或难治性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）的成人患者 2、复发或难治性25岁以下B细胞前体急性淋巴性白血病（ALL）
22	Abecma	idecabtagenevicleucel/艾基维仑赛	CelgeneCorporation	用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，这些患者既往经过四线及以上包括免疫调节剂、蛋白酶体抑制剂和抗CD38单克隆抗体的治疗
23	TECARTUS	brexucabtageneautoleucel/瑞基奥仑赛注射液	KitePharma, Inc.	复发性或难治性套细胞淋巴瘤
24	Libtayo	Cemiplimab-rwlc/西米普利单抗	赛诺菲、再生元	用于一线治疗PD-L1高表达（≥50%）的晚期非小细胞肺癌（NSCLC）患者
25	Truseltiq	Infigratinib英菲格拉替尼	联拓生物	用于成人既往接受过治疗的、不可切除的局部晚期或转移性的伴有成纤维细胞生长因子受体2（FGFR2）融合或其他重排（可通过FDA批准的检测方法检测）的胆管癌患者
26	Scemblix	Asciminib/阿思尼布	诺华肿瘤	SCSEMBLIX是一种激酶抑制剂，适用于治疗以下成年患者： 1. 既往接受过≥2种酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗的费城染色体阳性慢性髓性白血病（Ph+CML）慢性期（CP） 2. 携带T315I突变的Ph+CML慢性期

27	Retsevmo	Selpercatinib/塞普替尼	礼来	<p>1、Retsevmo单药用于患有以下疾病的成人患者的治疗：成人转移性RET融合阳性非小细胞肺癌患者（NSCLC）</p> <p>2、12岁及以上患有晚期或转移性RET-髓样甲状腺癌（MTC）且需要系统治疗的成人和儿童患者</p> <p>3、12岁及以上患有晚期或转移性RET融合阳性甲状腺癌且需要全身治疗的成人和儿童患者治疗和谁是放射性碘难治性的（如果是放射性碘合适）</p>
28	TheraSphere	TheraSphereYttrium-90GlassMicrospheresTheraSphereY-90玻璃微球剂量瓶	波科	TheraSphere用于治疗肝脏恶性肿瘤
29	TAZVERIK	tazemetostat/他泽司他	和黄医药	<p>1、用于治疗无法完全手术切除的转移性或局部晚期上皮样肉瘤成人及16岁以上儿童患者</p> <p>2、用于EZH2突变且既往接受过至少2种全身系统治疗的复发性或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者的治疗</p> <p>3、用于无合适的可替代治疗方案的复发性或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者的治疗</p>
30	Hexvix	HexaminolevulinateHydrochloridePowderAndSolventForIntravesicalSolution/膀胱灌注用盐酸氨酮戊酸己酯及专用溶剂	亚虹医药	Hexvix蓝光显影剂配合蓝色荧光膀胱镜使用，作为白光膀胱镜的辅助检查，可促进对高度可疑或已知膀胱癌患者的疾病诊断和管理
31	Scemblix	Asciminib/阿思尼布	诺华肿瘤	<p>SCSEMBLIX是一种激酶抑制剂，适用于治疗以下成年患者：</p> <p>1、既往接受过<math>\geq 2</math>种酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗的费城染色体阳性慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期(CP)</p> <p>2、携带T315I突变的Ph+CML慢性期</p>
32	Palynziq	pegvaliase-pqpz	BioMarin	Palynziq可降低患有苯丙酮尿症(PKU)的成人患者的血苯丙氨酸浓度，这些患者在现有治疗中未控制的血苯丙氨酸浓度大于600微摩尔/升
33	Xiaflex	collagenaseclostridiumhistolyticum	维健医药	XIAFLEX®是细菌胶原酶的组合，用于可触及条索状挛缩的杜普伊特挛缩症的成年患者；以及佩罗尼氏病的成年男性患者，在该药起始治疗时有可触及斑块和至少30度的弯曲畸形
34	Blenrep	Belantamab mafodotin	葛兰素史克	BLNREP作为一种单药疗法，适用于单药治疗符合下列条件的成年多发性骨髓瘤患者：既往接受过至少四种疗法，对至少一种蛋白酶体抑制剂、一种免疫调节剂，一种抗CD38单克隆抗体难治，末次治疗出现疾病进展的多发性骨髓瘤成人患者
35	Sarclisa	isatuximab-irfc/赛可益注射液	赛诺菲	<p>1、与泊马度胺和地塞米松联用，治疗既往接受过至少两种治疗(包含来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂，并在最后一次治疗中表现出疾病进展)的复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者</p> <p>2、与卡非佐米和地塞米松联用，治疗既往接受过至少一种治疗的多发性骨髓瘤成人患者</p>
36	Piqray	Alpelisib/阿培利司片	诺华肿瘤	Piqray与氟维司群联合治疗适用于治疗内分泌方案治疗期间或治疗后出现疾病进展、激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性、PIK3CA突变的晚期或转移性乳腺癌绝经后女性和男性患者。

37	Brineura	cerliponasealfa	BioMarin	Brineura是一种水解溶酶体N端三肽基肽酶，用于减缓3岁晚期婴儿神经元类蜡样脂褐素沉积症2型(CLN2)，也称为三肽基肽酶1(TPP1)缺乏症的症状性儿童患者的行走能力丧失。
38	Foscan	Temoporfin/替莫泊芬	佰礼医药	头颈颌面耳鼻咽喉部恶性肿瘤(鳞癌)。不能手术或不能放疗化疗的恶性肿瘤。
39	Voxzogo/ 伏佐高	vosoritide/伏索利肽	BioMarin	Voxzogo适用于2岁及以上骨骺未闭合的软骨发育不全患者的治疗。
40	Strensiq	Asfotasealfa/阿尔法	阿斯利康	适用于治疗围产期、婴儿及儿童起病发作(Juvenile-onset)的低磷酸酯酶症(HPP)患者。
41	Lonsurf/朗 斯弗	Trifluridine/Tipiracil Tablet曲氟尿苷替匹嘧啶片	大鹏药品	化疗后进展的不可切除的晚期或复发性胃癌
42	Ongentys/ 欧捷能	Opicapone/奥吡卡朋胶囊	江苏万邦	作为左旋多巴/多巴脱羧酶抑制剂(左旋多巴/苄丝肼或左旋多巴/卡比多巴)的联合治疗用药，用于治疗以上药物不能控制的成人帕金森病及剂末现象(症状波动)。
43	TRUSELTIQ	infigratinib/英菲格拉替尼	联拓生物	用于成人既往接受过治疗的、不可切除的局部晚期或转移性的伴有成纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)融合或其他重排(可通过FDA批准的检测方法检测)的胆管癌患者。
44	Zynlonta	Loncastuximab Tesirine-lpyl	瓴路爱迪思	适用于治疗两线或多线系统治疗后复发或难治的大B细胞淋巴瘤成年患者，包括非特指型DLBCL、源于低级别淋巴瘤的DLBCL和高级别B细胞淋巴瘤。
45	Phesgo	Pertuzumab/trastuzumab/Hyaluronidase-zzxf/帕妥珠单抗/曲妥珠单抗/透明质酸酶-zzxf注射剂	罗氏制药	早期乳腺癌：•用于HER2阳性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者(直径>2cm或淋巴结阳性)的新辅助治疗，作为早期乳腺癌整体治疗方案的一部分。•用于具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。 转移性乳腺癌：•本品和多西他赛联合，适用于HER2阳性、转移性或不可切除的局部复发性乳腺癌患者。针对转移性疾病，患者既往未接受过抗HER2治疗或者化疗。
46	BAVENCIO	Avelumab/阿维鲁单抗	默克	默克尔细胞癌;肾细胞癌;泌尿道上皮细胞癌。
47	Lutathera	LutetiumLu-177Dotatate/(177镧)镧氧奥曲肽注射液	诺华肿瘤	治疗不可切除或转移性、疾病进展、高分化(G1和G2)、生长抑素受体阳性的胃肠胰腺神经内分泌肿瘤(GEP-NETs)成人患者。
48	LysaKare	L-LysineHydrochloride/L-ArginineHydrochloride/L-赖氨酸盐酸盐/L-精氨酸盐酸盐	诺华肿瘤	减少成人患者在接受肽受体放射性配体疗法(177镧)镧氧奥曲肽注射液治疗时的肾脏辐射暴露。
49	Pluvicto	lutetiumLu177 vipivotidetetraxetan/镧[18Lu]特昔维匹肽	诺华肿瘤	PLUVICTO是一种放射性配体治疗剂，适用于治疗已接受雄激素受体(AR)通路抑制剂和基于紫杉烷的化疗的前列腺特异性膜抗原(PSMA)阳性转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)成年患者。

50	Locametz	Kitforthe preparation of gallium Ga68 gozetotide injection/ 用于制备镓 Ga68 gozetotide 注射液的试剂盒	诺华肿瘤	LOCAMETZ, 使用镓68进行放射性标记后, 作为一种放射性诊断试剂, 适用于通过正电子发射断层成像(PET)识别以下情况下前列腺癌男性患者的前列腺特异性膜抗原(PSMA)阳性病灶: 1. 怀疑存在转移, 作为初始确定性治疗的候选者。 2. 根据血清前列腺特异性抗原(PSA)水平升高, 怀疑出现复发。 3. 选择适用于镓 [Lu]177 vipivotide tetraxetan PSMA 靶向治疗的转移性前列腺癌患者。
51	BRAFTOVI	Encorafenib/康奈非尼	皮尔法伯	1、与binimetinib联合使用, 用于治疗患有不可切除性或转移性黑色素瘤伴BRAFV600突变的成年患者; 2、与西妥昔单抗联合使用, 用于治疗患有转移性结肠直肠癌(CRC)伴BRAFV600E突变, 且曾经接受过系统治疗的成人患者。
52	Halaven	Eribulin艾立布林	卫材	既往接受过蒽环类药物治疗的晚期脂肪肉瘤/平滑肌肉瘤
53	CYSTADANE	betaine anhydrous/盐酸甜菜碱无水口服溶液粉末	维健医药	同型半胱氨酸尿症的辅助治疗, 涉及以下缺乏或缺陷: 胱硫醚β-合成酶(CBS)、5,10-亚甲基-四氢叶酸还原酶(MTHFR)、钴胺素辅因子代谢(cb1)。CYSTADANE®应作为其他治疗的补充, 如维生素B6(吡哆醇)、维生素B12(钴胺素)、叶酸和特定的饮食。
54	CYSTADROPS	cysteamine hydrochloride/盐酸半胱胺溶液	维健医药	适用于治疗成人和2岁以上儿童胱氨酸病患者的角膜胱氨酸晶体沉积。
55	SCENESSE	Afamelanotid/阿法诺肽	维健医药	用于红细胞生成性原卟啉病(EPP)成人患者, 以预防光毒性。
56	ORPHACOL	cholic acid/胆酸硬胶囊	维健医药	适用于治疗1月龄至18岁婴儿、儿童和青少年以及成人, 因3β-羟基-Δ <sup>5</sup> -C <sub>27</sub> -类固醇脱氢酶缺乏或Δ <sup>4</sup> -3-氧代类固醇5β-还原酶缺乏引起的先天性胆汁酸合成缺陷。
57	Hexvix	Hexaminolevulinic Acid Hydrochloride Powder And Solvent For Intravesical Solution/膀胱灌注用盐酸氨基酮戊酸己酯及专用溶剂	亚虹医药	Hexvix蓝光显影剂配合蓝色荧光膀胱镜使用, 作为白光膀胱镜的辅助检查, 可促进对高度可疑或已知膀胱癌患者的疾病诊断和管理。
58	Vijoice	Alpelisib/阿培利司片	诺华肿瘤	用于经基于内分泌的治疗方案治疗后疾病进展的携带PIK3CA突变的激素受体阳性、人表皮生长因子受体-2阴性(HR+/HER2-)的晚期或转移性乳腺癌患者。
59	Koselugo	selumetinib/司美替尼	阿斯利康	限: 用于3岁及3岁以上伴有症状、不可手术的丛状神经纤维瘤(PN)的神经纤维瘤病1型(NF1)儿童患者
60	PADCEV	enfortumab vedotin-ejfv	安斯泰来	限: 局部晚期或转移性尿路上皮癌成人患者: 既往接受过程序性死亡受体-1(PD-1)或程序性死亡配体-1(PD-L1)抑制剂和含铂化疗

61	Lumakras	Sotorasib/索托雷塞	百济神州	限：适用于治疗既往接受过至少1种全身治疗的KRASG12C突变型局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者
62	TS-1/爱斯万	Tegafur, Gimeraciland OteracilPotassiumCapsule替吉奥胶囊	大鹏药品	限：胰腺癌
63	Daurismo	Glasdegib/格拉吉布	辉瑞	限：适用于与低剂量阿糖胞苷联合使用，用于在不能使用强化诱导化疗的≥75岁或患有合并疾病的成年患者中治疗新诊断的急性髓细胞性白血病（AML）
64	TIBSOVO	ivosidenib/艾伏尼布片	基石药业	限： 1、用于治疗携带IDH1突变的既往经治、局部晚期或转移性胆管癌成人患者 2、新诊断的IDH1突变的年龄至少75岁或因为其他合并症无法使用强化化疗的AML成人患者
65	Zepzelca/赞必佳	lurbinectedin/芦比替定	绿叶制药	限：用于治疗铂类药物化疗期间或之后发生疾病进展的转移性小细胞肺癌（SCLC）成人患者
66	TEPMETKO/拓得康	Tepotinib/特泊替尼	默克	限：含MET外显子14跳跃突变的局晚及转移性非小细胞肺癌（NSCLC）一线及后线治疗
67	Minjuvi	Tafasitamab	诺诚健华	限：与来那度胺联用，随后继续使用Tafasitamab单药治疗，用于治疗复发性或难治性且不适合自体干细胞移植（ASCT）的弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者
68	MEKTOVI	Binimetinib/比美替尼	皮尔法伯	限：与Encorafenib联合，用于治疗BRAFV600突变的不可切除或转移性黑色素瘤成人患者
69	Onureg	Azacitidine/阿扎胞苷片	施贵宝	限：强化诱导化疗后首次达到完全缓解（CR）或完全缓解伴血细胞计数不完全恢复（CRi）且不能完成强化治愈性治疗的急性髓系白血病（AML）成人患者的持续治疗
70	Reblozyl	Luspatercept-aamt/罗特西普注射液	施贵宝	限：用于治疗对促红细胞生成刺激剂失败，并且在过去8周内需要输注2个或2个以上单位红细胞的极低危到中危的、伴环状铁粒幼红细胞的骨髓增生异常综合征（MDS-RS）或伴环状铁粒幼红细胞和血小板增多的骨髓增生异常综合征/骨髓增生性肿瘤（MDS/MPN-RS-T）患者的贫血
71	SIR-Spheres	SIR-Spheres/钇[90Y]树脂微球	远大医药	限： 1、用于治疗不可手术的晚期肝癌患者 2、联合氟尿苷辅助化疗治疗不可手术切除的结直肠癌肝转移 3、介入性肝动脉灌注化疗或/及化学治疗后肿瘤无法控制的原发性结肠直肠癌肝转移；B型肝炎、高胆红素血症等肝功能不良患者不适用 4、以介入性栓塞或/及化学治疗后肿瘤无法控制之原发性结肠直肠癌肝转移；肝功能不良患者如：B型肝炎、黄疸指数过高等不得使用； 5、适用于治疗不适合根治性治疗（手术切除或射频消融）之肝细胞癌

72	Jeselhy	Pimitiespib	大鹏药品	限：癌症化疗后恶化的胃肠道间质肿瘤
73	Jelmyto	mitomycin	UroGenPharm a, INC.	限： JELMYTO是一种烷化剂药物，适用于治疗成人低级别上尿路尿路上皮癌(LG-UTUC)患者
74	Ibrance/爱博新	palbociclib/帕博西尼	辉瑞	限： 1、与芳香化酶抑制剂联合使用，作为激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌男性患者初始内分泌治疗 2、与氟维司群联用，治疗经过内分泌治疗疾病进展的患者
75	Vistogard	Uridinetriacetate	WellstatThe rapeutics	限：用于成人和儿童患者的紧急治疗： 在服用氟尿嘧啶或卡培他滨过量后，无论是否出现症状，或在氟尿嘧啶或卡培他滨治疗结束后96小时内，表现出影响心脏或中枢神经系统的早发、严重或危及生命的毒性，和/或早发、异常严重的不良反应(例如，胃肠道毒性和/或中性粒细胞减少)
76	Lumakras	Sotorasib/索托拉西布 AMG510	安进	用于治疗至少经过一次系统治疗的KRASG12c突变的非小细胞肺癌(NSCLC)患者
77	Tabrecta	Capmatinib/卡马替尼	Novartis(诺华)	MET14突变的肺癌，是目前MET14突变疗效最高的药物之一
78	Opdualag	瑞拉利单抗	百时美施贵宝	用于治疗12岁或以上且患有不可切除或转移性黑色素瘤的成人和儿童患者
79	Lynparza	Olaparib/奥拉帕尼	阿斯利康	已经完成化疗和局部治疗的早期HER2阴性、BRCA突变的高危早期乳腺癌。
80	ENHERTU	DS8201, fam- trastuzumabderuxteca n-nxki	阿斯利康	用于治疗不可切除或转移性HER2阳性，之前接受过全身治疗的非小细胞肺癌(NSCLC)的成年患者

**列表2. 罕见病特定药品及适用疾病清单**

药品的使用需符合中国国家药品监督管理部门批准的该药品说明书所列明的适应症及用法用量

进口药品的使用需符合中国国家药品监督管理局或出口国家或地区的药品监督管理部门批准的该药品说明书中所列明的适应症和用法用量，列表2中所有药品用药医院限二级及二级以上公立医院普通部

序号	商品名	分子名/药品名	厂家	疾病种类	适应症限制
1	捷灵亚	盐酸芬戈莫德胶囊	诺华	多发性硬化	本品适用10周岁以上患者复发性硬化(RMB)的治疗
2	特菲达	富马酸二甲酯肠溶胶囊	渤健	多发性硬化	用于治疗成人复发型多发性硬化
3	瑞普佳	阿加糖酶α注射用浓溶液	武田	法布里病	酶替代疗法
4	思而赞	注射用伊米昔酶	GenzymeEuro peB. V.	戈谢病	注射用伊米昔酶适用于确诊为非神经病变型(I型)和慢性神经病变型(型)谢病且有显著非神经系统病变临床表现的患者的长期酶替代疗法。戈谢病的非神经系统病变临床表现包括一种或多种以下病症： a. 排除其他原因导致的贫血，如缺铁性贫血 b. 血小板减少 c. 排除其他原因导致的骨病，如维生素D缺乏症

					d. 肝肿大或脾肿大
5	Radicut	依达拉奉氯化钠注射液	田边三菱制药	肌萎缩侧索硬化	1、改善与急性缺血性脑卒中相关的神经症状、日常活动障碍和功能失调 2、抑制肌萎缩侧索硬化症ALS患者功能障碍的发展。
6	Spinraza	诺西那生钠注射液	渤健	脊髓性肌萎缩症	SPINRAZA是一个针对生存运动神经元-2(SMN2)反义寡核苷酸适用为在儿童和成年患者中脊髓肌肉萎缩(SMA)的治疗
7	艾满欣	利司扑兰口服溶液用散	罗氏	脊髓性肌萎缩症	利司扑兰适用于治疗2月龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症(SMA)
8	喜达诺	乌司奴单抗注射液	杨森	克罗恩病	斑块状银屑病本品适用于对环孢素、甲氨喋呤(MTX)或PUVA(补骨脂素和紫外线A)等其他系统性治疗不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者
9	海芮思	艾度硫酸酯酶β注射液	北海康成	黏多糖贮积症II型	用于确诊的黏多糖贮积症II型(MPSII,亨特综合征)患者的酶替代治疗。本品尚未在38个月龄以下儿童中开展临床试验
10	唯铭赞	依洛硫酸酯酶α注射液	BioMarin	黏多糖贮积症IV型	本品适用于IVA型黏多糖贮积症患者(MPSIVA, MorquioA综合征)
11	艾而赞	注射用拉罗尼酶浓溶液	赛诺菲	黏多糖贮积症I型	本品适用于确诊为黏多糖贮积症I型(MPSI; α-L-艾杜糖苷酶缺乏症)患者的长期酶替代治疗,用于治疗疾病的非神经系统表现
12	科望	沙丙蝶呤片	百傲万里	四氢生物喋呤缺乏症,高苯丙氨酸血症	适用于对本品治疗有反应的四氢生物喋呤(BH4)缺乏所导致的高苯丙氨酸血症(HPA)
13	泽维可	麦格司他胶囊	爱可泰隆	C型尼曼匹克病	本品用于成人及儿童C型尼曼匹克病患者的进行性神经症状的治疗
14	健豪宁	注射用重组人生长激素	VetterPharma-FertigungGmbH&Co. KG	Prader-Willi综合征	儿童:由内源性生长激素分泌不足所致或由Turner's综合征或慢性肾功能不全引起的生长障碍。对Prader-Willi综合征(PWS),用于促进生长和改善机体的构成。PWS的诊断应采用适当的基因检测确诊。成人:对患有明显生长激素缺乏症的成人患者可作为替代治疗。严重生长激素缺乏症的成人患者定义为具有明确下丘脑垂体病变且至少有一种垂体激素(不包括泌乳素)缺乏的患者。这些患者应进行单次生长激素激发试验以确诊或排除生长激素缺乏。在儿童期发病的单纯生长激素缺乏而又没有下丘脑垂体病变或头颅经辐射证据的患者,应推荐进行两次生长激素激发试验。对已知IGF-I(胰岛素样生长因子-I)浓度降低(<2标准差评分)的患者可以考虑只进行一次生长激素激发试验。生长激素激发试验的切点值应极为严格

15	万立能	西尼莫德片	诺华	多发性硬化	适用于治疗成人复发型多发性硬化,包括临床孤立综合征,复发-缓解型疾病和活动性继发进展型疾病。
16	倍泰龙	注射用重组人干扰素β-1b	拜耳	多发性硬化	1.最近两年内有两次及以上复发的复发缓解型多发性硬化的病人。2.继发进展型多发性硬化的病人,具有以复发为迹象的活动性病变
17	万全	利鲁唑片	万特制药(海南)有限公司	肌萎缩侧索硬化	用于肌萎缩侧索硬化症
18	协一力	利鲁唑片	鲁南贝特制药有限公司	肌萎缩侧索硬化	用于肌萎缩侧索硬化症患者的治疗,可延长存活期和/或推迟气管切开的时间。
19	东维力	左卡尼汀口服溶液	东北制药	原发性肉碱缺乏症	用于防治左卡尼汀缺乏。
20	圣利卓	佩索利单抗注射液	勃林格殷格翰	成人泛发性脓疱型银屑病	佩索利单抗注射液是一种人源化拮抗性单克隆IgG1抗体,可与IL-36R结合并阻断人IL-36α、IL-36β和IL-36γ诱导的IL-36R活化,从而抑制炎症性皮肤病中的促炎和促纤维化通路。该品种的上市为泛发性脓疱型银屑病患者提供了新的治疗选择。

**列表3. 特定医疗器械及适用疾病清单**

药品的使用需符合中国国家药品监督管理部门批准的该药品说明书所列明的适应症及用法用量  
进口药品的使用需符合中国国家药品监督管理局或出口国家或地区的药品监督管理部门批准的该药品说明书中所列明的适应症和用法用量,列表3中所有医疗器械使用医院限二级及二级以上公立医院普通部

序号	特定医疗器械	适应症	厂家
1	胰岛素泵	I型糖尿病(限18岁以下未成年人)	美敦力
2	watchmanFLX®左心耳封堵器系统	1、房颤时间>3个月,持续性、永久性房颤(非风湿性瓣膜病所致) 2、年龄>18周岁 3、CHADS2-VAS(中风危险因素)评分≥2分 4、HAS-BLED(出血危险因素)评分≥3分 5、长期服用氯吡格雷和阿司匹林 6、有华法林应用禁忌证或无法长期服用华法林	波士顿科学
3	W2DR01植入式心脏起搏器	1、阿-斯综合征发作:各种原因(急性心肌梗死、急性心肌炎、洋地黄或抗心律失常药物等引起的中毒、电解质紊乱等)引起的房室传导阻滞、窦房结功能衰竭而导致的的心脏停搏并出现阿-斯综合征发作,都是紧急临时心脏起搏的绝对指征 2、心律不稳定的患者在安置永久心脏起搏器之前的过渡 3、心脏直视手术引起的三度房室传导阻滞 4、药物治疗无效的由心动过缓诱发的尖端扭转型和(或)持续性室性心动过速	美敦力
4	DTMA2QQ植入式再同步治疗心律转复除颤仪	预防心脏性猝死	美敦力
5	用于乳房一期再造的乳房假体器械	原发于乳腺的恶性肿瘤——重度(适用≥18周岁的女性被保险人)	强生

6	鞘内药物灌注系统	由肿瘤本身或肿瘤治疗相关因素导致的中、重度疼痛，经过规范化药物治疗1-2周疼痛缓解仍不满意或出现不可耐受的药物不良反应。 使用需同时满足以下两个标准： 1、中、重度持续性疼痛，数字化疼痛评分（NRS） $\geq 4$ ，伴或不伴爆发性痛 $\geq 3$ 次/天 2、遵循《NCCN临床实践指南：成人癌痛》《癌症疼痛诊疗规范（2011年版）》等相关癌痛治疗指南，阿片类镇痛药物单独和（或）联合辅助药物治疗1周仍为重度疼痛（NRS $\geq 7$ ），或治疗2周仍为重度疼痛（NRS $\geq 4$ ），或出现不可耐受的药物不良反应导致治疗不能持续	美敦力
7	CI-1600-04人工耳蜗植入体	1、儿童： 1) 双耳极重度耳聋（听阈 $\geq 90$ dBHL） 2) 2-17周岁的儿童或青少年，使用适当验配的助听器至少6个月 3) 12-23个月的婴幼儿使用适当验配的助听器至少3个月 2、成人： 1) 年龄 $\geq 18$ 周岁 2) 双耳重度至极重度感音神经性听力损失（ $\geq 70$ dBHL） 3) 重度至极重度语后听力损失	美国AB公司
8	注射用软骨再生胶原蛋白	软骨损伤的患者	美德实生物医疗
9	VitaFlow®经导管主动脉瓣膜系统	降低术后瓣周漏，降低血管并发症发生率	微创
10	人工虹膜	1、原发性闭角型青光眼早期或临床前期 2、急性（亚急性）闭角型青光眼缓解期 3、继发性青光眼虹膜膨隆 4、虹膜不完全切除 5、无晶体瞳孔阻滞性青光眼	人类光学股份公司

**列表4. 慢性疾病特定药品及适用疾病清单**

药品的使用需符合中国国家药品监督管理局或出口国家或地区的药品监督管理部门批准的该药品说明书中所列明的适应症和用法用量，列表4中所有药品用药医院为博鳌超级医院

序号	商品名	分子名/药品名	厂家	疾病种类	适应症
1	Fasenra	贝那利珠单抗	阿斯利康	嗜酸性表型的重度哮喘、伴多血管炎嗜酸性肉芽肿病（EGPA）	1、用于12岁及以上具有嗜酸性表型的重度哮喘患者的附加维持治疗 2、适用于伴多血管炎嗜酸性肉芽肿病（EGPA）治疗
2	Evenity	罗莫索单抗	UCB/安进	骨质疏松症	适用于绝经后骨折高危妇女的骨质疏松症治疗，骨折高危妇女被定义为有骨质疏松性骨折史或多种骨折风险因素；或对其他可用的骨质疏松症治疗失败或不耐受的患者。使用限制：使用期限最长不超过1年。如果骨质疏松症治疗仍然有必要，则应考虑使用抗吸收剂继续治疗

3	Bimzelx	比美吉珠单抗	UCB	银屑病、强直性脊柱炎	斑块状银屑病、非放射性中轴型脊柱关节炎、化脓性汗腺炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病关节炎 唯一双重机制，可同时强效、选择性地中和IL-17A和IL-17F
---	---------	--------	-----	------------	--